

CASO Nº 2: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR (ADENOIDEO, ACANTOLÍTICO).





FOTO Nº 1: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR EN HELIX DE OREJA DERECHA.




FOTO Nº 2: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR EN VERTEX DEL CUERO CABELLUDO.



C2F1

C2F1: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR. Se observa la panorámica del tumor epidermoide con patrón pseudoglandular y con fenómenos acantolíticos, de allí su denominación. Es un tumor que afecta personas de edad, en áreas expuestas al sol (piel glabra del cuero cabelludo, bordes de orejas, labios). Puede originarse de la transformación de una queratosis actínica superficial y/o de un carcinoma espinocelular superficial “in situ”, como lo denomina Ackerman.



C2F2

C2F2: CARCINOMA ESPINOCELULAR PSEUDOGLANDULAR:


Nº 1. Detalle de la porción acantolítica, patrón adenoideo.

Nº 2: Porción sólida queratótica donde se presentan cambios de disqueratosis celular maligna.

La patología se puede originar de un carcinoma epidermoide “in situ” en áreas expuestas al sol.




C2F3



C2F4

C2F3: Silueta del tumor, en vista panorámica, como aparece publicado en el texto de Lever: Histopathology of the Skin. 7TH Edition (1990).


C2F4: Detalle acantolítico. Lever W.: Histopathology of the Skin. 7TH edition, 1990, muy similar al caso presentado por el Dr. G. Planas G (C2F2)



C2F5: Carcinoma Pseudo-Glandular. Detalle de la porción acantolítica y pseudoglandular en Lever's Histopathology of the Skin. (Editor-in-Chief: David E. Elder), 9TH Edition, 2005.

C2F5

C2F6: Carcinoma Pseudo-Glandular. Porción sólida y queratónica del tumor en Lever's Histopathology of the Skin (Editor-in-Chief: David E. Elder), 9TH Edition, 2005



C2F6

NOTA: Este tumor lo describió originalmente el Profesor Dante Borelli, en 1948, en una lesión del borde bermellón del labio inferior de un paciente y así aparece en las referencias de los diferentes textos de W. Lever. (Borelli D. Aspetti pseudoglandolari nell' epithelioma discheratosico: "Adenoacanthoma of sweat glands" di Lever. Dermatológica 1948; 97:193).

En la literatura francesa, también se le rinde merecido reconocimiento a su publicación. J. Civatte y A. Poiars-Baptista (de la Facultad de Medicina de París y de la Facultad de Medicina de Coimbra, Portugal, respectivamente) en el capítulo "Epithéliomas spino-cellularis", publicado en la Encyclopédie Médico-Chirurgicale (1966), bajo el subtítulo de "*épithéliomas diskératosiques*".

Esta afección también ha sido conocida con los nombres de "épithélioma spino-cellulaire segregans (Delacretaz et coll.); "Adeno-acanthome des glandes sudoripares "(Lever). Me resultó curioso que un prestigioso micólogo, con lo fue Dante Borelli, haya incursionado en sus años mozos, con tan buen tino, en el campo de la Histopatología.