


# SINDROME DE HIPERSENSIBILIDAD A LA DAPSONA (SHD)

- ✦ Reacciones adversas a fármacos frecuentes: 2 y 3% de los ptes.
- ✦ 1/1.000 ptes. presenta una reacción cutánea severa.
- ✦ La incidencia del (SHD) es menos común, de 1/1.000 a 10.000
- ✦ Las reacciones a drogas son enfermedades autolimitadas.
- ✦ Tratamiento sintomático.
- ✦ Tasa de mortalidad del SHD es aprox. 10%.
- ✦ Asociado a hepatitis puede ser de 10 a 38%, por lo que es importante hacer el diagnóstico

# **SINDROME DE HIPERSENSIBILIDAD A LA DAPSONA (SHD)**

- **Variante del DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)**
- **En 1950, Lowe publicó la 1ª descripción del SHD asociado a DDS.**
- **Latencia droga ofensora(DDS) y SHD: 4 a 7 sem**
- **No correlación entre dosis e intensidad de lesiones.**

## Etiopatogenia:



## **MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHD**

### **SISTÉMICAS**

- **Fiebre**
- **Neumonitis**
- **Linfadenopatía**
- **Hepatitis**
- **Anemia hemolítica**
- **Carditis**

### **DERMATOLÓGICAS**

- **Dermatitis exfoliativa**
- **Eczema/erupción maculopapular**
- **Erosiones orales**
- **Vesículas y ampollas**
- **Fotosensibilidad**

### **LABORATORIO**

- **Hemólisis**
- **Anemia**
- **Eosinofilia**
- **Elevación de transaminasas, bilirrubina y FA**
- **Linfocitosis atípica**
- **Hipogammaglobulinemia**

## TRATAMIENTO PARA SHD

**1.- Descontinuar medicamento ( Dapsona).**

**2.- Terapia de soporte:**

**Reemplazo de volumen intravenoso.**

**Soporte nutricional (enteral o parenteral).**

**Antibiótico (en caso de sepsis).**

**Prevenir sobreinfección en piel.**

**3.- Terapia específica:**

**Esteroides (Prednisona 1mg/Kg/d)**

**Reemplazo de hormona tiroidea (asociación  
tardía de**

**hipotiroidismo)**

**Consejo familiar (factores genéticos**

**involucrados)**

## **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

- **Narasimha Rao P, Lakshmi TSS. Increase in the incidence of dapsona hypersensitivity syndrome, an appraisal. Lepr Rev 2001; (72): 57-62**
- **Kennebeck K, Gregory A. Anticonvulsant hypersensitivity syndrome. J Am Board Pract 2000; 13 (5): 364-370**
- **Ghislain PD, Roujeau JC. Treatment of severe drug reactions: Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis and hypersensitivity syndrome. Derm on Line 2003; 8: 1-19**
- **Kumar RH, Kumar MV, Tapa DM. Dapsona syndrome –a five year retrospective analysis. Indian J Lepr 1988; 70: 271-276**
- **Roujeau JC, Stern RS. Severe adverse cutaneous reactions to drugs. The New Engl J of Medicine 1994; 10: 1272-1285**
- **Prussick R, Shear NH. Dapsona hypersensitivity syndrome. J Am Acad Dermatol 1996; 35: 346-349**
- **Sullivan JR. The drug hypersensitivity syndrome. What is the pathogenesis? Arch Dermatol 2001; 137: 357-364**