

Abstract

[WOLOSKER, Nelson](#) et al. **O uso da oxibutinina no tratamento da hiperidrose facial.**

An. Bras. Dermatol. [online]. 2011, vol.86, n.3, pp. 451-456. ISSN 0365-0596. <http://dx.doi.org/10.1590/S0365-05962011000300005>.

FUNDAMENTOS: Hiperidrose facial é uma doença que pode levar os pacientes a sérios distúrbios emocionais. A simpatectomia torácica vídeo-assistida proporciona excelente resolução da hiperidrose facial, mas está associada a algumas complicações, sendo a mais frequente e mais importante a hiperidrose compensatória. Especialmente em pacientes submetidos à ressecção do segundo gânglio torácico, o risco de hiperidrose compensatória grave é maior, o que pode causar insatisfação com o procedimento. **OBJETIVO:** O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia e a satisfação dos pacientes com o uso da oxibutinina em doses baixas para tratar a hiperidrose facial em uma série grande de pacientes. **MÉTODOS:** 25 pacientes com hiperidrose facial foram tratados com oxibutinina. Os pacientes foram submetidos a duas avaliações: antes e depois do tratamento. Estas foram usadas para avaliar a melhoria clínica e a qualidade de vida. **RESULTADOS:** Observou-se que mais de 75% dos pacientes evoluíram com melhora na hiperidrose facial, sendo que 52% deles apresentaram uma grande melhora. **CONCLUSÃO:** O tratamento da hiperidrose facial com oxibutinina é uma boa alternativa à simpatectomia, visto que apresenta bons resultados e melhora a qualidade de vida, e os pacientes não correm o risco dos efeitos colaterais da simpatectomia

Keywords : Hiperidrose; Indicadores de qualidade de vida; Protocolos clínicos; Simpatectomia; Sudorese; Tratamento avançado.

Comentarios: en nuestro país (Venezuela) la oxibutinina se conoce como **Reteven** comprimidos de 5 mg y el **Reteven LP** en comprimidos también, de 5 mg y 10 mg de laboratorios Nolver, usado para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, en este trabajo la dosis fue dada al atardecer entre 2.5 mg y 5 mg por 12 semanas.