

ACNE - ALGORITMO TERAPÊUTICO - 2014

COMEDONIANA

TRATAMENTO TÓPICO (Opção ou associação)		
Retinóides	Antimicrobianos	Combinações fixas
<ul style="list-style-type: none"> Tretinoína Adapaleno Isotretinoína 	<ul style="list-style-type: none"> Peróxido de benzoíla (PB) 	<ul style="list-style-type: none"> PB + Adapaleno

Cuidados dermatocósméticos
<ul style="list-style-type: none"> Limpadores Restauradores da barreira cutânea Adstringentes Queratólíticos Protetores solares
Procedimentos
<ul style="list-style-type: none"> Extração de comedões Eletrocauterização "Peeling" químico superficial Microdermoabrasão

PÁPULO-PUSTULOSA

Leve

Moderada

Grave

TRATAMENTO TÓPICO (Opção ou associação)		
Combinações fixas	Antimicrobianos	Retinóides
<ul style="list-style-type: none"> PB + Clindamicina PB + Adapaleno PB + Eritromicina Tretinoína + Clindamicina 	<ul style="list-style-type: none"> PB Ácido azelaico 	<ul style="list-style-type: none"> Tretinoína Adapaleno

Cuidados dermatocósméticos
<ul style="list-style-type: none"> Limpadores Restauradores da barreira cutânea Adstringentes Queratólíticos Protetores solares
Procedimentos
<ul style="list-style-type: none"> Extração de comedões Eletrocauterização Infiltração intralesional com corticoides "Peeling" químico superficial Microdermoabrasão Crioterapia Terapia com luzes


Antibióticos orais
<ul style="list-style-type: none"> Doxiciclina Limeciclina Minociclina Tetraciclina Eritromicina (≤ 8 anos)

NÓDULO-CÍSTICA

Leve

Moderada

Grave



Tratamento de manutenção: Retinóides tópicos ± PB



Colégio Ibero-Latino Americano de Dermatologia



Grupo Ibero-Latino Americano de Estudo da Acne