

DERMATOLOGÍA EN CUADROS

Enfermedades que muestran el patrón de reacción

liquenoide (dermatitis de interfase)

Piel Latinoamericana - Edición 381

Liquen plano

El liquen plano variantes *

Liquen nítido

Liquen estriado

Liquen plano-como queratosis

Erupciones liquenoides drogas *

Erupciones de drogas fijos *

El eritema multiforme y variantes *

'Id' reacción superantígeno *

Enfermedad de injerto contra huésped*

Dermatitis por radiación subaguda *

Erupción de la recuperación de linfocitos

Dermatitis de interfase SIDA

Lupus eritematoso*

Dermatomiositis

Congénita Poiquilodermia (Ie) *

Síndrome de Kindler

Eritema telangiectático congénita (síndrome de Bloom)

Liquen escleroso y atrófico

Disqueratosis congénita

Poiquilodermia de Civatte

Pitiriasis liquenoide *

Reacciones virales persistentes

Perniosis

Erupción solar polimorfa (tipo milimétrica)

Pénfigo paraneoplásico

Púrpura liquenoide

Dermatitis de contacto liquenoide

Enfermedad de Still (inicio adulto)

Sífilis secundaria Late

Poroqueratosis

Erupciones de drogas

Dermatitis fototóxica

Pigmentosa Prurigo

Erythroderma

La micosis fungoide

La regresión de las verrugas y tumores

La regresión de la pitiriasis rosada

Liquen amiloide

Vitiligo

Reacción liquenoide tatuaje

Enfermedades marcados con un * pueden tener un patrón verdadero de interfaz .
