

DERMATOLOGIA EN CUADROS

Dermatoscopia en Dermatología General – Dermatosis inflamatorias -

Enfermedad	Criterio dermatoscópico	Valor clínico dermatoscópico
Psoriasis	Vasos punteados con una distribución regular, escamas blancas.	-Mejora el diagnóstico. -Permite la diferenciación con dermatitis, liquen plano, pitiriasis rosada, pitiriasis rubra pilaris. -monitorización de la respuesta al tratamiento sistémico y tópico.
Dermatitis	Vasos punteados con distribución parcheada, costras o escamas amarillas.	-Mejora el diagnóstico. -Permite la diferenciación con la psoriasis, liquen plano, pitiriasis rosada, micosis fungoides.

Liquen plano	Estría de Wickham, periférico punteado o vasos lineales.	-Permite el diagnóstico. -Facilita la diferenciación entre psoriasis, dermatitis,
Variantes pigmentadas	Puntos azules grisáceos o pigmentación desestructuradas.	sarcoidosis liquenoide. -Monitorea el curso de la enfermedad
Pitiriasis rosada	Fondo amarillento, periférico con escamas blancas, vasos punteados con distribución parcheada.	-Ayuda al diagnóstico. - mejora la diferenciación con la psoriasis, dermatitis, liquen plano.
Sarcoidosis	Áreas o glóbulos naranjas o amarillentos, vasos lineales.	-Mejora el diagnóstico de una enfermedad granulomatosa.
Granuloma anular	Vasos punteados, lineales o punteados/lineales, fondo blanco, rojo o amarillo.	-Facilita la diferenciación de otras enfermedades granulomatosas de la piel.

Necrobiosis lipoidica

Red prominente de vasos de arborización lineales y un color de fondo amarillo.

-Mejora el diagnóstico.
- Facilita la diferenciación de otras enfermedades granulomatosas de la piel.

Lupus eritematoso discoide

Lesiones tempranas

Halo blanquecino perifolicular, taponamiento folicular y escamas blancas.

-Facilita la diferenciación de rosácea, sarcoidosis, lupus vulgaris, queratosis actínica.

Lesiones tardías

Telangiectasias, estructuras pigmentarias y áreas blanquecinas sin estructura.

-Monitorea el curso de la enfermedad.

Rosácea

Tipo eritematotelangiectásico

Vasos poligonales.

Tipo papulopustuloso

Tapones foliculares, pustulas foliculares, vasos poligonales.

-Mejora el diagnóstico, incluyendo la clasificación de subtipos.
-Facilita la diferenciación de dermatitis seborreica, sarcoidosis, lupus vulgaris, lupus eritematoso discoide.

Liquen escleroso

Lesiones genitales

Áreas desestructuradas blancas o amarillentas, vasos lineales.

- Mejora el diagnóstico.
- Facilita la diferenciación de la morfea.
- Monitorea el curso de la enfermedad.

Lesiones extra genitales

Áreas desestructuradas blancas o amarillentas, tapones amarillentos queratósicos.

Morfea

Haz fibróticos blanquecinos, vasos lineales.

- Mejora la diferenciación con el liquen escleroso.

Urticaria común

Red de vasos lineales que rodean áreas vasculares.

- Mejora la diferenciación de la vasculitis urticaria.

Vasculitis urticaria

Lesión de urticaria con puntos o glóbulos purpuras, fondo marrón anaranjado.

-Mejora la diferenciación con la urticaria común.

